



ГАПОУ «Байкальский базовый медицинский колледж МЗ  
РБ»

# Роль медицинской сестры в послеоперационной профилактике спаечного процесса при остром аппендиците

Выполнила: студентка 643

группы

Замбалаева Юлия Вячеславовна Руководитель дипломной работы:

преподаватель Профессионального цикла Заборовский Олег Анатольевич

# АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

- Острый аппендицит относится к наиболее распространенным хирургическим патологиям брюшной полости, на его долю приходится около 90%. В странах умеренного климата острый аппендицит является массовым заболеванием, а порой не исключены летальные исходы. Аппендэктомия может привести к таким последствиям, как вторичное бесплодие у женщин, спаечная непроходимость кишечника, образование грыж и другие. По поводу спаечной болезни брюшины ежегодно в хирургических отделениях лечится 1% прооперированных ранее пациентов, у 50% которых развивается острая спаечная кишечная непроходимость с послеоперационной летальностью от 10 до 15% случаев.

# Цель, задачи, практическая значимость


**Цель:** изучить особенности оказания сестринской помощи в послеоперационной профилактике спаечного процесса при остром аппендиците.

## **Задачи:**


- провести анализ статистических данных по распространённости острого аппендицита и его послеоперационных осложнений по данным РФ, РБ и ГАУЗ «Иволгинская ЦРБ» за 2020-2022 гг.;
- провести анкетирование пациентов хирургического отделения ГАУЗ «Иволгинская ЦРБ», которым была проведена аппендэктомия;
- разработать памятку для пациентов по профилактике послеоперационных осложнений после аппендэктомии.

**Практическая значимость** данного исследования заключается в разработке практических рекомендаций по профилактике послеоперационных осложнений после аппендэктомии и в практическом исследовании на основе сбора статистических данных о пациентах, которым была проведена аппендэктомия на базе ГАУЗ «Иволгинская ЦРБ».

# Данные по заболеваемости острым аппендицитом за 2020-2022 гг. на 100 тыс. населения




# Структура послеоперационных осложнений после аппендэктомии по данным ГАУЗ «Иволгинская ЦРБ» в 2020-2022 гг., %




- кровотечение из сосудов брыжейки
- несостоятельность культи червеобразного отростка
- динамическая кишечная непроходимость
- послеоперационный инфильтрат
- абсцессы
- пилефлебит

# Социологическое исследование

Распределение респондентов по полу, %



Распределение респондентов по возрасту? %




# Социологическое исследование

## Симптомы в начале болезни, %




## Место обращения при появлении симптомов, %




# Социологическое исследование

## Вставание с кровати в послеоперационном периоде, %



## Наличие и характер выделений в области шва после операции, %



## Заключение

- По данным ГАУЗ «Иволгинская ЦРБ» отмечается снижение заболеваемости острым аппендицитом.
- Случаи острого аппендицита чаще встречаются среди лиц мужского пола в возрасте 18-40 лет.
- Наибольшую долю составляют катаральные формы.
- Отмечается снижение частоты спаечных процессов.
- Анализ проведённого анкетирования показал, что пациенты, которым была проведена аппендэктомия, имеют следующие риски развития послеоперационных осложнений:
  - позднее обращение в больницу;
  - ранняя физическая активность после операции;
  - тяжёлая форма аппендицита;
  - гнойные выделения в области шва;
  - незнание особенностей питания после аппендэктомии;
  - расстройства ЖКТ после операции.

Спасибо за внимание!