

1 Наиболее адекватным принципом антиалкогольной пропаганды является

- А) пропаганда трезвого образа жизни
- Б) пропаганда культурного потребления алкоголя
- В) пропаганда потребления легких вин
- Г) все перечисленное

2 Реабилитация больных наркоманией предусматривает

- А) организацию условий для полноценного комплексного поддерживающего лечения больных
- Б) психологический тренинг
- В) социальную помощь
- Г) все перечисленное

3 Медицинское освидетельствование для установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения должно осуществляться

- А) по направлению правоохранительных органов
- Б) по направлению должностных лиц и администрации по месту работы
- В) по личному обращению граждан
- Г) во всех перечисленных случаях

4 При решении вопроса о годности к службе в армии больной наркоманией

- А) годен к службе
- Б) ограниченно годен
- В) не годен

5 Стационарная судебно-наркологическая экспертиза назначается

- А) по уголовным делам
- Б) лицам, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу
- В) в исключительных случаях, когда средства и методы амбулаторной экспертизы исчерпаны
- Г) по гражданским делам

6 Поводом для применения принудительных мер медицинского характера являются все перечисленные ситуации, кроме

А) хронического алкоголизма с отказом от лечения

Б) систематического пьянства

В) пьянства в сочетании с систематическим нарушением общественного порядка или трудовой дисциплины

Г) причинения семье материального ущерба в результате пьянства

7 Стойкая утрата трудоспособности II группы устанавливается большим алкоголизмом во всех перечисленных случаях, кроме

А) выраженных мнестических расстройств, сочетающихся с частыми (4-5 раз в месяц) эпилептическими припадками

Б) выраженной деградации, достигающей степени слабоумия и нарушением навыков самообслуживания

В) выраженного травматического гемипареза

Г) деградации, не достигающей степени слабоумия

8 Больной Н., 49 лет, злоупотребляет алкоголем в течение 5 лет, последние 2,5 года опохмеляется. По словам жены, особенно злоупотреблял выпивкой последние полгода. На фоне легкого простудного заболевания у больного отмечался запой в течение 3-х дней, употреблял водку. Затем, после прекращения выпивки (больному необходимо было выйти на работу), у него внезапно нарушился сон, появились тревога, беспокойство, страх.

Вечером, закрыв глаза, стал видеть мух, пауков, "каких-то других мерзких насекомых". В ужасе открывал глаза, и тогда все исчезало. На следующий день чувствовал себя лучше, но к вечеру вновь стал видеть мух и пауков, на этот раз уже и с открытыми глазами, чувствовал, как они ползают по коже, кусают его, через некоторое время с удивлением заметил, что в комнате появились куры и мыши, которые стали преследовать его. Он прятался, бегал, кричал, решил повеситься, но не мог сообразить, как это лучше сделать.

Затем стал слышать голоса неизвестных мужчин за дверью, сговаривающихся его убить. Обращался к близким: "Слышите, что они говорят? Не пускайте их в дом", при этом испытывал сильный страх, не реагировал и не понимал смысла обращений к нему. Не спал всю ночь. При стационарировании был резко возбужден, весь дрожал, был покрыт холодным потом.

Данные проявления типичны для:

А) Острый алкогольный галлюциноз

Б) Алкогольный делирий

В) Острый алкогольный параноид

Г) Острый инфекционный психоз

Д) Симптоматический психоз

9 В приемный покой психиатрической больницы в 2 часа 30 мин. утра был доставлен больной В. 30 лет. По имеющимся сведениям от жены, злоупотребляет алкоголем последние 3 года. Заболел остро, три часа тому назад, после того, как застала больного сидящим на кухне и выпивающим из горлышка бутылки.

Была вызвана скорая помощь в связи с неправильным поведением, не спал, был возбужден, "заговаривался", ползал по полу.

В приемном покое дезориентирован, испытывает зрительные устрашающие галлюцинации, отрывочные бредовые идеи преследования, страх, тревогу. Находится в состоянии психомоторного возбуждения. Жалуется на тошноту, боли в животе, отмечаются фебрильные подергивания век, мышц лица, миоз, гипергидроз, гиперсаливация. АД - 130/90. Температура - 37,2 С.

Оцените психопатологическое состояние:

А) Алкогольный делирий

Б) Алкогольный онейроид

В) Острый шизофренический психоз

Г) Острый алкогольный параноид

Д) Острый алкогольный галлюциноз

10 Диагностируйте состояние, определите лечебную тактику. В приемный покой наркологического стационара доставлен больной З., 20 лет. Больной был подобран на улице. Отмечалось состояние возбуждения, перешедшее в оглушение. В больницу доставлен на носилках. Контакт недоступен. Лежит неподвижно, на внешние и болевые раздражители не реагирует. Из рта - запах алкоголя. В ротовой полости - остатки рвотных масс. Кожные покровы бледные, цианотичные. Кожа влажная. Температура 35 С, артериальное давление - 90/50 мм.рт.ст., дыхание поверхностное, редкое (8-10 в мин.). Реакция зрачков на свет, сухожильные и кожные рефлексы отсутствуют. Отмечаются тонические судороги жевательных и затылочных мышц.

Оцените психопатологическое состояние:

А) Абстинентный синдром

Б) Алкогольное опьянение в тяжелой степени

В) Алкогольный делирий

Г) Алкогольное опьянение в средней степени

Д) Патологическое опьянение

11 Целью наркологической службы является оказание

А) лечебно-профилактической помощи

Б) медико-социальной помощи

В) медико-юридической помощи

Г) всего перечисленного

12 Важным условием успешной лечебной работы стационара является

А) интенсивное проведение дезинтоксикационной

Б) организация индивидуальной и групповой психотерапии

В) раннее подключение мероприятий реабилитационного характера

Г) все перечисленное

13 Борьба с пьянством и алкоголизмом включает в себя все перечисленные формы, исключая

А) запретительные

Б) ограничительные

В) медицинские

Г) морально-этические

Д) социальные

14 К социальным последствиям пьянства и алкоголизма относятся все перечисленные, кроме

А) самоубийств

Б) сокращения продолжительности жизни на 15-20 лет

В) более 50% бракоразводных процессов

Г) нарушений поведения в обществе и в семье

Д) убытков по бюджету здравоохранения

15 К внешним характерным признакам алкогольного синдрома плода относятся все перечисленные, кроме

А) уменьшения окружности головы

Б) широкой уплощенной переносицы, короткого носа

В) длинной верхней губы

Г) узких глазных щелей

Д) заячьей губы

16 К начальным регистрам негативных синдромов относятся все перечисленные, кроме

А) истощаемости психической деятельности

Б) субъективно осознаваемой изменчивости личности

В) объективно определяемой изменчивости личности

Г) продуктивных нарушений

Д) дисгармонии личности

17 Вызывает затруднения психопатологическая квалификация всех перечисленных состояний депрессии, кроме

А) типичной витальной

Б) иронической

В) вегетативной

Г) дистрофической

Д) астенической

18 К навязчивостям, сопровождающимся тягостным аффектом, относятся все перечисленные, кроме

А) сомнений и воспоминаний

Б) представлений и влечений

В) мудрствования и счета

Г) страхов (фобий)

Д) чувства антипатии и опасения

19 Истинные зрительные галлюцинации могут быть следующими, кроме

А) бесформенных, с неотчетливой или очерченной формой

Б) с величиной видений натуральной, уменьшенной, увеличенной

В) бесцветных, цветных

Г) подвижных или неподвижных

Д) все правильно

20 При истинных тактильных галлюцинациях возникают

А) ощущение ползания по телу насекомых

Б) ощущение появления на поверхности тела посторонних предметов

В) ощущение появления под кожей посторонних предметов

Г) все перечисленные ощущения

Д) ни одно из перечисленных ощущений

1 "Сверхострая" форма алкогольной энцефалопатии характеризуется

А) проявлениями мусситирующего делирия

Б) клиническими признаками, свойственными профессиональному делирию

В) грубыми соматоневрологическими расстройствами

Г) высокой частотой летальных исходов

Д) всем перечисленным

2 В структуре развернутого классического алкогольного галлюциноза, кроме вербальных галлюцинаций можно обнаружить все перечисленное, кроме

А) синдрома растерянности

Б)аффекта тревоги

В)бредовых расстройств

Г)глубокого помрачения сознания

3 В настоящее время для наркоманий характерны все перечисленные тенденции, исключая

А) появление новых форм наркотиков, смену их

Б)склонность к комбинированному приему наркотиков

В)рост числа женщин, злоупотребляющих наркотиками

Г)преимущественное употребление средств растительного происхождения

Д)появление новых путей введения наркотиков

4 Ведущими звеньями патогенеза наркоманий являются все перечисленные, кроме

А)нарушения функции катехоламиновой системы

Б)нарушения транспорта ионов кальция через мембраны нервных клеток

В)нарушения обмена серотонина

Г)перестройки оплатных рецепторов

Д)нарушения обмена витаминов группы В

5 Клиника острой интоксикацией суррогатами опия проявляется

А)резко и грубо выраженным ощущением "толчка" или удара в голове

Б)повышенным фоном настроения с ощущением прилива сил, работоспособности

В)психомоторным возбуждением

Г)всем перечисленным

Д)ничем из перечисленного

6 У наркомана при сформировавшемся заболевании можно наблюдать все перечисленные формы эйфории, кроме

А)нетрансформированной

Б)энергизирующей

В)стимулирующей

Г)тонизирующей

7 Общими чертами актуализации компульсивного влечения к наркотику для всех форм наркоманической зависимости являются все перечисленные,

А)исключая

Б)внезапное ухудшение настроения

В)появление раздражительности

Г)ухудшение аппетита, сна

Д)появление головной боли

Е)злость, напряженность

8 Формирование абстинентного синдрома происходит в сжатые сроки при употреблении

А)барбитуратов

Б)суррогатов опиоидов

В)гашиша

Д)эфедрона

9 Дефицитарные нарушения более выражены при наркомании

А)опийной

Б)барбитуровой

В)гашишной

Г)эфедроновой

Д)кокаиновой

10 Патоморфоз наркоманий обусловлен всем перечисленным, кроме

А) использования новых синтетических средств

Б)использования средств растительного происхождения

В)омоложения состава наркотизирующихся

Г)использования новых путей введения наркотиков



11 Для II фазы абстинентного синдрома при барбитуровой наркомании характерно все перечисленное, исключая

- А) гиперрефлексию
- Б) мышечную гипертензию
- В) мелкий тремор
- Г) подъем артериального давления
- Д) сонливость

12 Наиболее яркими эффектами острой интоксикации галлюциногенами являются все перечисленные, кроме

- А) психопатологических нарушений
- Б) поведенческих реакций
- В) соматических расстройств
- Г) вегетативных нарушений

13 Систематическое вливание основного наркотика и прием ноксирона приводит

- А) к более быстрому развитию наркомании
- Б) к формированию истинной полинаркомании
- В) и к тому, и к другому
- Г) ни к тому, ни к другому

14 Для формирования и течения наркомании, осложненной токсикоманией, характерно постепенное вытеснение из употребления определенного количества исходного наркотика, вплоть до полной замены

- А) быстрое развитие привыкания (1.5-2 месяца)
- Б) наступление более "чистой" эйфории
- В) изменение внешнего вида и личности больных, развитие психозов
- Г) все перечисленное

15 Клиническими особенностями полинаркоманий являются

- А) комфортность состояния лишь
- Б) отсутствие в состоянии абстиненции качественно новых, в сравнении с абстиненциями соответствующих чистых форм, симптомов

В) утяжеление большей части симптомов, составляющих общий радикал форм абстиненции (невозможность взаимопогашения симптомов)

В)"омоложение" абстиненции, равнозначность ее проявлений II стадии мононаркотизма

Г)все перечисленные

16 Клиника острой интоксикации небарбитуровыми снотворными проявляется всем перечисленным, кроме

А)беспричинного веселья

Б)желания действовать, смеяться, говорить

В)неустойчивого аффекта, проявляющегося то веселостью, то грустью, то раздражительностью

Г)неустойчивости внимания, скачка мыслей

Д)невозможности уснуть на спаде интоксикации

17 В клинике острой интоксикации циклодолом выделяют следующие фазы

А)эйфорическую

Б)суженного сознания

В)галлюцинаторную

Г)все перечисленные

Д)ни одну из перечисленных

18 Клиника острой интоксикации димедролом при схожести ее с циклодоловой отличается от последней

А)утратой на высоте интоксикации критики к состоянию

Б)опасностью больных в состоянии острой интоксикации для себя и окружающих

В)развитием помрачения, спутанности сознания при добавлении к димедролу алкоголя

Г)всем перечисленным

Д)ничем из перечисленного

19 Для делириозных расстройств в структуре острой интоксикации средствами бытовой и промышленной химии характерно все перечисленное, кроме

А)сценopodobности, красочности, обилия расстройств восприятия

Б)аффективной насыщенности

В)последовательно сменяющих друг друга картин с определенным сюжетом

Г)содержания галлюцинаций, не влияющих на аффективное состояние и поведение больных

Д)изменчивости и подвижности галлюцинаторных образов

20 Наиболее адекватным определению понятия "Профилактика" отвечает

А)система медицинских мер, направленных на предупреждение заболеваний, охрану здоровья населения

Б)комплексная система государственных, социально-экономических, медико-санитарных, психолого-педагогических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний, на всемерное улучшение здоровья населения

В)комплексная система санитарно-гигиенических, медицинских и государственных мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний и всемерное укрепление здоровья населения

Г)все перечисленное