

Итоговые тестовые вопросы по дисциплине «Психиатрия» для стоматологов 3 курс

?

У больного крайне неустойчивое настроение, которое легко и быстро меняется под влиянием ситуации. Сдерживать свои эмоции больной не в состоянии

- дисфория
- эйфория
- маниакальное состояние
- амбивалентность
- + эмоциональная лабильность

?

Больной безучастен к окружающему и своему положению, ничто не вызывает эмоционального отклика, его ничто не радует и не огорчает

- дисфория
- депрессия
- недержание эмоций
- + апатия
- амбивалентность

?

К расстройствам эмоций относится все кроме:

- Депрессии
- Маниакального возбуждения
- Эйфории
- Дисфории
- + Амнезии

?

В соответствии с Международной классификацией болезней к веществам, способным вызвать зависимость, относят:

- производные опиоидов
- вещества гипнотического и седативного характера
- кокаин

- индийскую коноплю
- + все перечисленные

?

К специфическим нарушениям при шизофрении относится все, кроме:

- символического мышления
- паралогического мышления
- аутистического мышления
- абулии
- + делирия

?

К специфическим нарушениям при шизофрении относятся все, кроме:

- паралогики
- эмоциональной парадоксальности
- парабулии
- + судорожных припадков
- амбивалентности

?

Алкоголизм – это хроническое заболевание, характеризующееся:

- прогрессивным течением
- развитием патологического влечения к спиртным напиткам
- формированием абстинентного синдрома при прекращении употребления алкоголя
- развитием стойких соматоневрологических расстройств и психической деградации
- + всем перечисленным

?

Образец речи больного, находящегося в формально ясном сознании: " Я шел по улице, а справа пронесли длинную пожарную кишку. Где же эта книга? Не бывает ведь снега без мороза. Если бы прибавить и отнять, то все равно сопротивление кончится"

- фобический синдром

- бред воздействия
- ритуальные расстройства
- + разорванное мышление
- персеверации

?

Признаками депрессивного синдрома являются

- двигательная заторможенность
- идеаторная заторможенность
- снижение фона настроения
- нарушение сна
- +верно все перечисленное

?

Формирование абстинентного синдрома происходит в сжатые сроки при употреблении:

- кокаина
- + героина
- гашиша
- марихуаны
- алкоголя

?

Больной безучастен к окружающему и своему положению, ничто не вызывает эмоционального отклика, его ничто не радует и не огорчает

- тревога
- тоска
- эмоциональная ригидность
- астения
- + апатия

?

У больного немотивированно веселое настроение, все воспринимается им " в розовом цвете". Больной оптимистичен, на отрицательные аффекты не реагирует, переоценивает свои возможности. Темп мышления ускорен, в беседе отвлекаем.

- дисфория
- амбивалентность

- недержание эмоций
- + маниакальное состояние
- эмоциональная лабильность

?

Оглушение проявляется всем перечисленным, кроме:

- понижения вплоть до полного исчезновения ясности сознания
- повышения порога возбудимости для внешних раздражителей
- замедленности, затруднения мышления, трудности в осмыслении ситуации в целом при правильной оценке наиболее элементарных явлений окружающего
- аспонтанности, малоподвижности
- + выраженных галлюцинаторных и бредовых включений

?

Укажите вид патологии: больной утверждает, что постоянно ощущает ползающих по телу насекомых:

- Псевдогаллюцинации
- Истинные галлюцинации
- Функциональные галлюцинации
- Висцеральные галлюцинации
- + Тактильные галлюцинации

?

Больной в детстве тонул в реке, был спасен, но с тех пор панически боится плавать на лодке, пароходе, переходить реку по мосту.

- обсессивный синдром
- бред воздействия
- + фобический синдром
- бред отношения
- бред метаморфозы

?

Интропроекция галлюцинаторных переживаний типична для:

- истинных галлюцинаций
- + псевдогаллюцинаций
- функциональных галлюцинаций
- рефлекторных галлюцинаций
- галлюциноза

?

Для апато-абулического синдрома типично все кроме:

- снижение двигательной активности
- безразличие
- + ускоренные ассоциации
- безучастность
- эмоциональная анестезия

?

Больной веселый, благодушный, считает себя несметно богатым, дарит окружающим миллионы, раздает награды, заявляет, что «трижды герой мира», что является «агентом всех разведок Вселенной». Определите синдром

- маниакальный
- + парафренный
- параноидный
- деменция
- гебефренический

?

Девочка воспитывалась в семье, где ей все поклонялись, считая самой умной, самой красивой, самой хорошей. Самое лучшее отдавалось ей, вопреки потребностям других членов семьи. Училась плохо, но родители обвиняли учителей, что они «не поняли девочку», «не оценили нашу умницу». Какая

личность могла сформироваться у ребенка в будущем?

- тревожная
- параноидная
- шизоидная
- + истероидная
- астеническая
- ?

Девушка 16 лет, нормостенического телосложения, после замечания соседки, что она «пухленькая» стала ограничивать себя в еде. Отказывалась от обеда и ужина. За завтраком съедала только одно яблоко. При попытке накормить насильственно, самопроизвольно вызывала рвоту. За две недели похудела на 5 килограммов, однако считает, что она «очень полная».

Определите состояние

- нервная булимия
- гипобулия
- + нервная анорексия
- депрессия
- ипохондрия

?

Подросток после ингаляций паров бензина на белой стене ванной комнаты увидел ползающих змей. Змеи сползали по стенам на пол, где превращались в тараканов огромных размеров.

Определите синдром

- + зрительный галлюциноз
- псевдогаллюциноз
- параноидный синдром
- паранойяльный синдром
- иллюзии

?

Пациент страдает бронхиальной астмой и принимает атропиноподобные препараты. Возникла тревожность, на полу и обоях

видел причудливые картины, которые были в серебристо-голубоватых тонах и постоянно менялись. Одновременно слышал музыку, которая соответствовала картинам. В дальнейшем увидел, как из-под дивана выползают рыжие муравьи, заполняют весь пол и двигаются к стене.

Присутствовала дезориентировка в месте и времени.

Определите синдром

- галлюцинаторный
- параноидный
- + делириозный
- онейроидный
- иллюзорный

?

Для патологического аффекта не характерно:

- неспособность руководить своими действиями
- отсутствие критической оценки и своим действиям
- + сохранение и воспроизведение в памяти действий, совершённых в аффекте
- глубокий, короткий сон в состоянии аффекта
- амнезия действий, совершённых в аффекте

?

Депрессивные состояния всегда характеризуется

- чувством тоски
- идеями самообвинения
- суицидальными мыслями
- + все перечисленное
- ничего из перечисленного

?

Укажите вид галлюцинаторного расстройства: больной в пустой

квартире слышит голоса, комментирующие его действия:

- Рефлекторные галлюцинации
- + Комментирующие галлюцинации
- Императивные галлюцинации
- Функциональные галлюцинации
- Внушенные галлюцинации

?

Больной ни к чему не проявляет интереса, не разговаривает, время проводит в постели, отгородившись от окружающих одеялом. Питает только в том случае, если приводят с принуждением за стол и кормят с ложки. Часто мочится в постель и не проявляет инициативы, чтобы ему сменяли постельное белье.

- гипобулия
- стререотипии
- каталепсия
- + апато - абулия
- гипербулия

?

Больной многоречив до хрипоты, с любым из больных пытается поговорить, но не выслушав последнего, с увлечением декламирует стихи другому. Увидев, что санитарка пытается мыть пол, бросается ей на помощь, но вскоре, бросив начатое, дает советы больным, играющим в шахматы. Он неистощим в своей деятельности, говорит скороговоркой, настроение приподнятое.

- эйфория
- кататоническое возбуждение
- + маниакальное возбуждение
- тревожное возбуждение
- гипербулия

?

Укажите вид галлюцинаторного нарушения: больной слышит голос, который запрещает ему принимать лекарство:

- Гипнагогические галлюцинации
- Внутренние галлюцинации
- Сценические галлюцинации
- + Императивные галлюцинации
- Рефлекторные галлюцинации

?

Абулия проявляется в:

- Физической и психической слабости
- Речевой замкнутости
- + Отсутствия внутренних желаний, побуждений, бездеятельности
- Нелепом поведении
- Отсутствии аппетита

?

Для астении нехарактерно:

- Повышенная утомляемость, апатия
- + Эйфория
- Раздражительность
- Ухудшения внимания
- Снижение трудоспособности

?

Тревога характеризуется всем кроме:

- + конкретного содержания
- направленности в будущее
- затрагиванием «ядра» личности
- внутреннего напряжения
- пессимистических опасений

?

Состояние, при котором больной не отвечает на вопросы и даже знаками не дает понять, что он согласен вступить в контакт с окружающими, называется

- негативизм
- вербигерация

+ мутизм

- шизофазия
 - стереотипия
- ?

Обеднение речи, малый запас слов называется

- брадифазия
- логорея
- дислалия
- + олигофазия

- парафазия

?

Среди этиологических факторов для шизофрении наиболее важным является:

- экзогенный
- психогенный
- + наследственный
- инфекционный
- психологический

?

Злокачественная шизофрения наиболее часто встречается в возрасте:

- + 14-18 лет
- 20-25 лет
- 25-30 лет
- свыше 40
- 30-40 лет

?

Качество ремиссии определяются в большей степени:

- редуцией психопатологической симптоматики
- + отсутствием дефицитарной симптоматики
- социальной и трудовой адаптацией
- наличием поддерживающей терапии нейролептиками
- диспансерным наблюдением

?

Гебефреническое возбуждение проявляется

- повышенным настроением и самочувствием
- нарушением внимания
- дезориентировкой в месте, времени и собственной личности
- + гримасничаньем, кривлянием, нелепо-дурашливым поведением
- активным и пассивным негативизмом

?

Ипохондрией называется:

- + Наклонность выискивать у себя болезни, которых нет
- Раздражительная слабость
- Неприятные ощущения в теле
- Нарушение восприятия
- Соматический ответ на неосознаваемый психологический конфликт

?

Идеи, которые больные наиболее критически оценивают:

- Паранойяльные
- Сверхценные
- + Навязчивые
- Параноидные
- Парафренические

?

Симптомокомплекс соматических, неврологических и психопатологических расстройств, возникающих при прекращении употребления психоактивных веществ – это:

- астенический синдром
- депрессивный синдром
- ипохондрический синдром
- + похмельный синдром
- дисфория

?

Мотивами потребления наркотиков чаще всего являются:

- Удовлетворение любопытства
- Желание отвлечься от будничных трудностей
- Необходимость признания «своим» в микрогруппе
- Желание испытать новые ощущения
- + Все перечисленное

?

Начало заболевания классической параноидной шизофренией приходится на возраст:

- 14-18 лет
- 20-25 лет
- + 25-30 лет
- свыше 40
- 30-40 лет

?

Для параноидной формы шизофрении основными осевыми синдромами являются расстройства

- эмоциональные нарушения
- + галлюцинаторно – бредовые
- двигательно-волевые нарушения
- грубое расстройство поведения
- аффективные нарушения

?

Для кататонической формы шизофрении основными осевыми синдромами являются:

- эмоциональные нарушения
- галлюцинаторно- бредовые
- + двигательно-волевые нарушения
- грубое расстройство поведения
- аффективные нарушения

?

Для простой формы шизофрении основными осевыми синдромами являются:

- + эмоциональные нарушения
- галлюцинаторно- бредовые
- двигательно-волевые нарушения
- грубое расстройство поведения
- аффективные нарушения

?

Для гебефренической формы шизофрении основными осевыми синдромами являются:

- + эмоциональные нарушения и грубое нарушение поведения
- галлюцинаторно- бредовые
- двигательно-волевые нарушения
- мнестические
- аффективные нарушения

?

Для вялотекущей (латентной) формы шизофрении основными осевыми синдромами являются расстройства

- эмоциональные нарушения
- + неврозо- и психопатоподобные нарушения
- двигательно-волевые нарушения
- грубое расстройство поведения
- аффективные нарушения

?

Сосредоточенность на субъективных болезненных переживаниях, выискивание несуществующих болезней относятся к:

- дисфорической реакции на болезнь
- обсессивно-фобической реакции на болезнь
- + ипохондрической реакции на болезнь
- паранойяльной реакции на болезнь

- эргопатической реакции на болезнь

?

Личностная реакция на болезнь, проявляемая повышенным фоном настроения, легкомыслием к болезни и лечению, называется:

- паранойяльной
- + эйфорической
- ипохондрической
- тревожно - депрессивной
- меланхолической

?

Назовите симптом: больной утверждает, что его жена с помощью специального аппарата вызывает у него атрофию мозга. С целью избегания воздействия вредоносного аппарата, носит на голове шапочку:

- Бред преследования
- Бред отношения
- + Бред физического воздействия
- Паранойяльный бред
- Сверхценные идеи

?

Для состояния эпилептического статуса характерно все, кроме

- высокой частоты судорожных приступов
- приступы проявляются тонико-клоническими судорогами
- сохранение выключенного сознания/комы/ между приступами
- + сохранность сознания между приступами
- нарушение статики

?

Для малых припадков типично все, кроме

- + грубого нарушения статики

- пароксизмальности
- частичного сохранения сознания
- выключения сознания
- ауры

?

Больной жалуется, что боится острых, режущих и колющих предметов. Не решается брать их в руки. Понимает, что страх нелеп, но побороть его не может.

- + обсессивный синдром
- бред ущерба
- фобический синдром
- ритуальные расстройства
- персеверации

?

Признаками маниакального состояния являются

- двигательная и идеаторная активность
- уменьшение продолжительности сна
- повышение настроения
- + все перечисленное
- ничего из перечисленного

?

К психическим эквивалентам при эпилепсии относится все, кроме:

- дереализационных нарушений
- трансовых состояний
- + большого судорожного приступа

приступа

- дисфорических и дистимических расстройств
- амбулаторных автоматизмов

?

Основным симптомом шизофрении не является:

- Галлюцинаторный
- Бредовой
- Психомоторный

- Аффективный
- + Амнестический

?

Для состояния эпилептического статуса характерно все, кроме

- частота судорожных припадков от 2 до 20 в час
- приступы проявляются тонико-клоническими судорогами
- сохранение выключенного сознания/комы/ между приступами
- + сохранность сознания между приступами
- нарушение статики

?

Выделите форму шизофрении, которая не существует:

- Простая
- Параноидная
- Кататоническая
- + Делириозная
- Гебефреническая

?

К преморбидным особенностям больных эпилепсией относится все, кроме:

- + аутизации
- ночного энуреза
- снохождения
- приступов вздрагивания во время сна
- кошмарных сновидений

?

Для депрессии нехарактерно:

- Понижение настроения
- Снижение аппетита
- Двигательная заторможенность
- + Ускорение мышления
- Нарушение сна

?

Псевдогаллюцинации **могут входить** в структуру следующих синдромов:

- амнестического синдрома
- судорожного синдрома
- + синдрома психического

автоматизма

- психоорганического синдрома
- оглушения

?

Галлюцинаторные переживания с необычной, парадоксальной проекций типична для

- истинных галлюцинаций
- псевдогаллюцинаций
- + экстракомпийнных галлюцинаций
- всего вышеуказанного
- галлюциноза

?

К психическим эквивалентам при эпилепсии относится все, кроме:

- сумеречные состояния
- аффективные состояния
- онейроидные состояния
- параноидный синдром
- + деменции

?

Галлюцинаторные переживания, провоцируемые реальным раздражителем однотипного анализатора типичны для

- истинных галлюцинаций
- псевдогаллюцинаций
- экстракомпийнных галлюцинаций
- рефлекторных галлюцинаций
- + функциональных галлюцинаций

?

К нормальным типам мышления относят:

- + Ассоциативное мышление
- Паралогическое мышление
- Разорванное мышление
- Бессвязное мышление
- Аутистическое мышление

?

Галлюцинаторные переживания, вызванные реальным раздражителем, но проецирующиеся на другом анализаторе типичны для

- истинных галлюцинаций
- псевдогаллюцинаций
- экстракомпийнных галлюцинаций
- + рефлекторных галлюцинаций
- галлюцинозе

?

Интропроекция галлюцинаторных переживаний типична для:

- истинных галлюцинаций
- + псевдогаллюцинаций
- экстракомпийнных галлюцинаций
- рефлекторных галлюцинаций
- галлюциноза

?

К нормальным типам мышления относят:

- + Ассоциативное мышление
- Паралогическое мышление
- Разорванное мышление
- Аутистическое мышление
- Автоматизм

?

Помраченное сознание по типу делирия сопровождается

- псевдогаллюцинациями
- + истинными галлюцинациями
- экстракомпийными галлюцинациями
- рефлекторными галлюцинациями
- иллюзиями

?

Идеаторное торможение

проявляется всем, кроме:

- замедленной тихой речи
- трудностями переработки новой информации
- снижением памяти
- невозможностью сосредоточиться
- + ускорения ассоциативных процессов

?

Больной сообщает, что его сосед намерен отнять у него имущество, а его самого погубить. Сосед владеет гипнозом, с помощью которого вызывает боли в желудке у больного, жжение в кишечнике, поносы, атрофию мозга. Он же вызывает у больного отвратительные запахи, придает пище неприятный вкус.

- фобический синдром
- обсессивный синдром
- бред ущерба
- бред ревности
- + бред воздействия

?

Больной считает, что изобрел аппарат, при помощи которого можно «излечить эпилепсию, следить за врагом, уничтожить врага в тылу, готовить пищу».

- бред воздействия
- бред отношения
- разорванное мышление
- персеверации
- + бред изобретательства

?

Помраченное сознание (по типу онейроида) часто сопровождается

- + псевдогаллюцинациями
- истинными галлюцинациями
- экстракомпийными галлюцинациями
- рефлекторными галлюцинациями
- функциональными галлюцинациями

?

Алкоголизм - это все

перечисленное, кроме:

- хроническое прогрессирующее заболевание
- заболевание, развивающееся вследствие длительного употребления спиртными напитками
- заболевание с патологическим влечением к спиртным напиткам
- заболевание, обусловленное сначала психической, а затем физической зависимостью от алкоголя
- + острая интоксикация алкоголем

?

Доклиническими проявлениями

алкоголизма являются все

перечисленные, кроме:

- Сохранения защитного рвотного рефлекса
- Отсутствие измененных картин опьянения
- Сопорозного опьянения
- + Алкогольных психозов
- Отсутствие расстройств памяти

?

Патопсихологические методики

исследования памяти позволяют

оценить все перечисленное, кроме:

- Непроизвольного и произвольного запоминания

- Оперативной памяти
- Опосредованного запоминания
- Смыслового запоминания
- + Уровень интеллекта

?

Уход от окружающей действительности - это:

- Апатия
- + Аутизм
- Абулия
- Автоматизм
- Амбивалентность

?

Несвойственная для больных алкоголизмом характеристика личности:

- Психопатизация
- Акцентуация
- + Самореализация
- Деграция
- Деменция

?

Для патологического опьянения характерно все перечисленное, кроме:

- Внезапности, остроты и транзиторности психотического эпизода
- Импульсивности и целенаправленности характера разрушительных, нередко криминальных действий
- Сумеречного состояния сознания
- Кризисного разрешения глубоким сном с последующей амнезией и астенией
- + Сохранения критики к своему состоянию

?

Ведущий признак патологического опьянения:

- Психомоторное возбуждение
- Амнезия

- Оглушенность
- + Сумеречное состояние сознания
- Дисфория

?

К психоактивным веществам относится все, кроме:

- табака
- алкоголя
- каннабиоидов
- кокаина
- + уксуса

?

Диссимуляция –это:

- Сознательное притворное поведение, направленное на изображение психического заболевания
- + Сознательное утаивание имеющихся болезненных расстройств
- Умышленное изображение симптомов только что перенесенного психического заболевания
- Умышленное и сознательное преувеличение симптомов имеющихся в настоящее время заболеваний
- Отрицание наличия болезни

?

Назовите вид галлюцинаций: больной постоянно слышит недифференцированные звуки:

- сложные галлюцинации
- + Акоазмы
- Функциональные
- Рефлекторные
- Псевдогаллюцинации

?

Назовите психопатологический симптом: больной заявляет, что он слышит звучание как своих, так и чужих мыслей

- + Псевдогаллюцинации
- Функциональные галлюцинации
- Внушенные галлюцинации
- Иллюзии
- Гипнопомпические галлюцинаций

?
 Назовите психопатологический симптом: больной испытывает чувство измененности предметов: воспринимает их то большими, то маленькими, то скошенными и т. д.:

- Деперсонализация
- Зрительные галлюцинации
- Сенестопатии
- Галлюциноз
- + Психосенсорные расстройства

?
 Укажите вид патологии: больной чувствует в своем желудке ползающих змей:

- Сенестопатии
- + Висцеральные галлюцинации
- Нарушение схемы тела
- Иллюзии
- Псевдогаллюцинации

?
 Укажите вид патологии: больной утверждает, что постоянно ощущает ползающих по телу насекомых:

- Псевдогаллюцинации
- Истинные галлюцинации
- Функциональные галлюцинации
- Висцеральные галлюцинации
- + Тактильные галлюцинации

?
 Укажите вид галлюцинаторного расстройства: больной в пустой квартире слышит голоса, сопровождающие его действия:

- Рефлекторные галлюцинации
- + Комментирующие галлюцинации
- Императивные галлюцинации

- Функциональные галлюцинации
- Внушенные галлюцинации

?
 Укажите вид галлюцинаторного нарушения: больной слышит голос, который запрещает ему принимать лекарство:

- Гипнагогические галлюцинации
- Внушенные галлюцинации
- Сценические галлюцинации
- + Императивные галлюцинации
- Рефлекторные галлюцинации

?
 Укажите вид галлюцинаторного расстройства: больной в момент пробуждения разговаривает сам с собой:

- Вербальные
- Функциональные
- Экстракомпинные
- Гипногические
- + Гипнопомпические

?
 Укажите вид патологии восприятия: больной, после перенесенного гриппа, жалуется на то, что обычный свет лампочки кажется ему ослепительным, обычный разговор воспринимается как невыносимо громкий:

- Иллюзии
- Рефлекторные галлюцинации
- Сенестопатии
- Акозмы, фонемы
- + Гиперестезия

?
 Законодательные акты в наркологии касаются разделов:

- социальных
- правовых
- медицинских
- +и тех, и других
- ни тех, ни других

Целью наркологической службы является оказание:

- лечебно-профилактической помощи
 - медико-социальной помощи
 - медико-юридической помощи
 - + все перечисленные
 - ничего неверно
- ?

В задачи врачей общесоматической сети входит:

- выявление лиц, страдающих пьянством и алкоголизмом и направление их на лечение в наркологические учреждения
 - раннее выявление и лечение заболеваний, связанных с пьянством и алкоголизмом
 - + все перечисленные
 - проведение антиалкогольной санитарно-гигиенической пропаганды
- ?

Укажите вид патологии: больной жалуется на тягостные неприятные ощущения в голове, которые ему трудно описать и конкретизировать:

- Гиперестизия
 - + Сенестопатии
 - Иллюзии
 - Галлюцинации
 - Психосенсорные нарушения
- ?

Симптомокомплекс соматических, неврологических и психопатологических расстройств, возникающих при прекращении употребления психоактивных веществ это

- астенический синдром
- депрессивный синдром
- ипохондрический синдром
- + абстинентный синдром

- дисфория
?

Преморбид больных наркоманией характеризуется всем перечисленным, кроме:

- Возбудимости
 - Чувства несвободы
 - Невозможности действовать и проявлять свою эмоциональность непосредственно
 - + Сформированности индивидуальных интересов, зрелости личности
 - Непоследовательности и лабильности
- ?

Назовите симптом: больной убежден, что соседи по палате – подставные лица. Находит среди них своих родственников и сослуживцев:

- Бред отношения
 - + Бред положительного двойника
 - Бред отравления
 - Бред воздействия
 - бред величия
- ?

Больная после неприятного известия перестала говорить, общалась с близкими только письменно:

- Кататонический мутизм
 - + Истерический мутизм
 - Психогенный негативизм
 - Органическая афазия
 - Симулятивное поведение
- ?

Больной 15 лет, доставлен в приемный покой. На вопросы отвечает громким смехом, свистом. Принимает вычурные позы, передразнивает врача, гримасничает. Вскочил со стула, начал отбивать чечетку. Заплакал,

но тут же заявил, что он всех разыгрывает:

- Маниакальное возбуждение
- Кататоническое возбуждение
- Делириозное возбуждение
- + Гебефреническое возбуждение
- Истерическое возбуждение

Маниакальная триада характеризуется:

- Повышенным настроением
- Ускорением ассоциаций
- Двигательным возбуждением
- + Всем перечисленным
- Ничем из перечисленных

Наркотическую эйфорию составляют все перечисленные признаки, исключая:

- Подъем эмоционального фона
- Изменение мышления
- + Неприятные соматические ощущения
- Расстройство восприятия
- Нарушение сознания

Истерический припадок проявляется всем перечисленным, кроме:

- + Припадка с клонической и тонической фазами, прикусом языка
- Разнообразных сложных, выразительных движений
- Психогенной обусловленности
- Усиления и затягивания во времени при скоплении людей вокруг
- Судорожными параксизмами

Выраженное состояние эмоциональной пассивности:

- Аутизм
- Астения

- + Апатия
- Абулия
- Аутизация

Бредовые идеи характеризуются всем перечисленным, кроме:

- Несоответствия действительности
- + Доступности исправления, устранения путем убеждения
- Искажения отражений действительности
- Полного овладения сознанием
- Невозможности исправления, несмотря на явное противоречие с действительностью

Для депрессивной триады характерно все перечисленное, кроме:

- Аффекта тоски
- Двигательного торможения
- + Помрачения сознания
- Идеаторного торможения
- Депрессивного содержания мышления

Боязнь площадей и улиц:

- Нозофобия
- Кардиофобия
- Клаустрофобия
- + Агорафобия
- Танатофобия

К расстройствам ориентировки относится все перечисленное, кроме:

- Дезориентировки во времени
- Дезориентировки в ситуации
- + Расстройства сознания личности, сопровождающегося отчуждением психических свойств личности

- Расстройства ориентировки в месте
- Расстройства ориентировки в собственной личности

?

Заболевание, которое **не относится** к психогенным:

- Неврозы
- + Маниакально- депрессивный психоз
- Реактивная депрессия
- Аффективно-шоковые реакции
- Реактивный паранойд

?

Сенестопатии характеризуются всем перечисленным, кроме:

- Разнообразных, крайне мучительных, тягостных ощущений в различных частях тела
- Необычности, вычурности ощущений
- Отсутствия, констатируемых соматическими методами исследования, причин
- Частных сочетаний с ипохондрическими расстройствами
- + Амнезии

?

Психогении возникают в результате:

- Интоксикаций
- Инфекций
- + Психотравмы
- Лучевого поражения
- Черепно-мозговой травмы

?

Аффективные иллюзии характеризуются всем перечисленным, кроме:

- + Приобретения характера «деланности», насильственности
- Искаженного восприятия, связанного с необычным эмоциональным состоянием
- Возникновения при патологических изменениях аффекта
- Возникновения при страхе, тревоге
- Усиления к вечеру

?

Выделите несуществующую форму невроза:

- Истерический
- Депрессивный
- Ипохондрический
- + Шизоидный
- Неврастения

?

Для сосудистых поражений головного мозга нехарактерно:

- Склонность к прогрессивности течения
- Нарастание мнестико-интеллектуальных расстройств
- Изменение личности
- + Исход- выздоровление
- Эпилептические припадки

?

Состояние, требующее неотложной госпитализации в психиатрическое учреждение:

- Травматическая церебрастения
- Истерический невроз
- + Реактивная депрессия с суицидальными тенденциями
- Астеническая психопатия
- Алкоголизм 1-ой стадии

?

Кататонический ступор проявляется всем перечисленным, кроме:

- Обездвиженности застывшего амимичного лица
- + Выраженного депрессивного аффекта
- Повышения мышечного тонуса
- Длительного сохранения одной позы
- Мутизма, негативизма

?

- Маниакальное состояние характеризуется всем перечисленным, кроме:
- + Суицидальных мыслей
 - Чрезмерного стремления к деятельности
 - Незаконченности и немотивированности переходов от одного вида деятельности к другому
 - Повышенного аффекта
 - Ускорения темпа мышления и речи

?

В шуме электробритвы больной слышит голос, комментирующий его поведение, описанное галлюцинаторное нарушение является:

- Экстроконцептивными галлюцинациями
- + Функциональными галлюцинациями
- Псевдогаллюцинациями
- Внушенными галлюцинациями
- Гипнагогическими галлюцинациями

?

Из названных галлюцинаций самыми опасными являются:

- Псевдогаллюцинации
- Истинные галлюцинации
- Функциональные галлюцинации
- Комментирующие галлюцинации
- + Императивные галлюцинации

?

Назовите симптом: на фоне страха при тусклом освещении больной увидел угрожающий образ человека:

- Зрительные истинные галлюцинации
- Псевдогаллюцинации
- + Аффективные иллюзии
- Парейдолические иллюзии
- Дерееализация

?

Назовите симптом: больной ощущает чувство раздиранья, жжения, щекотания в области желудка, кишечника:

- Истинные галлюцинации
- Псевдогаллюцинации
- + Сенестопатии
- Дерееализация
- Висцеральные галлюцинации

?

Назовите симптом: больной временами ощущает чувство увеличенной головы, либо удлинение (уменьшение) конечностей, туловища, веса тела:

- + Нарушение схемы тела
- Дерееализация
- Диперсонализация
- Иллюзорные расстройства
- Галлюцинации

?

Назовите симптом: больной видит «где-то в голове» сцены из прошлой жизни, он уверен, что это «специально» ему показывают:

- + Псевдогаллюцинации
- Истинные галлюцинации
- Галлюциноз
- Дерееализация
- Императивные галлюцинации

?

Ведущий признак патологического опьянения:

- Психомоторное возбуждение
- Амнезия
- Оглушенность
- + Сумеречное состояние сознания
- Дисфория

?

Возникающий помимо воли
больного наплыв мыслей:

- Шперрунг
- + Ментизм
- Символизм мышления
- Словесная окрошка
- Вербигерация

?

Сомнолентность проявляется всем
перечисленным, кроме:

- Состояние полусна (большую часть
времени лежит с закрытыми глазами)
- Отсутствия спонтанности речи
- + Галлюцинаторных расстройств
- Правильных ответов на простые
вопросы
- Способности внешних
раздражителей на некоторое время
ослабить симптоматику

?

Онейроидное (сновидное)

помрачение сознания проявляется
всем перечисленным, исключая:

- Полную отрешенность больных от
окружающего
- + Судорожные расстройства
- Фантастическое содержание
переживаний
- Видоизменение и перевоплощение
своего Я
- Глубокое расстройство
самосознания

?

Сознательное стремление скрыть
болезнь:

- Симуляция

- + Диссимуляция
- Аггравация
- Анозогнозия
- Деперсонализация

?

Для купирования эпилептического
статуса используют

- + внутривенное введение диазепама
- внутривенное введение амиазиана
- галоперидол
- антидепрессанты
- внутривенное введение ноотропов

?

Расстройство побуждений
проявляется всем перечисленным,
кроме:

- Повышения волевой активности
- Снижения волевой активности
- Отсутствия побуждений
- Извращения волевой активности
- + Деменции

?

Гипобулия проявляется всем
перечисленным, кроме:

- Пониженной волевой активности,
бедности побуждений, вялости,
бездеятельности
- Скудной, лишенной
выразительности речи, снижения
двигательной активности
- + Повышения мышечного тонуса
- Ослабления внимания, обеднения
мышления
- Ограничения общения вследствие
снижения откликаемости

?

Абулия проявляется всем
перечисленным, исключая:

- Отсутствие побуждения
- Утрату желания
- Полную безучастность и
бездеятельность
- Исчезновение высших
потребностей

+ Галлюцинаторные расстройства
?

Гипербулия проявляется всем перечисленным, кроме:

- Повышения волевой активности, усиления побуждений
- Повышенной деятельности
- + Анорексии
- Порывистости, инициативности
- Говорливости, подвижности

Олигофрении характеризуются всем, кроме

- интеллектуального дефекта
- неспособностью длительное время концентрировать внимание
- сниженной памятью
- + возможности коррекции интеллектуальной недостаточности, выздоровления
- возможным развитием психотической симптоматики

Дисфория это:

- Расстройство характера
- + Тоскливо-злобное настроение с агрессивностью
- Состояние, противоположное депрессии
- Плаксивая депрессия
- Любое расстройство настроения

?

Укажите нарушение сознания, сопровождающееся психомоторным возбуждением:

- Обнубиляция
- + Делирий
- Оглушенность
- Сопор
- Кома

?

Эпилептический статус это:

- Описание клиники эпилепсии

- Особенности личности больного эпилепсией

- Серия эпилептических припадков с четко фиксированными стадиями

+ Серия эпилептических припадков без восстановления сознания между приступами

- Особенности мышления больных эпилепсией

?

Укажите наиболее частые побочные осложнения при лечении нейрорептиками:

- Аллергические реакции
- + Экстрапирамидные расстройства
- Гипотензивный эффект
- Гипертензивный эффект
- Поражение печени

?

Назовите из перечисленных форм злокачественную форму шизофрении:

- Неврозоподобная
- + Юношеская
- Депрессивно - параноидная
- Циркулярная
- Психопатоподобная

?

Для истерического личностного расстройства наиболее характерно:

- Тревожность
- Мнительность
- Склонность к образованию навязчивых идей
- Ригидность психических процессов
- + Демонстративность, театрализованность

?

Перечислите эмоциональные нарушения наиболее характерные для больных шизофренией:

- Эйфория
- + Эмоциональная парадоксальность
- Дисфория

- Дистимия
- Эмоциональная лабильность
- ?

Укажите, для какого заболевания **нехарактерен** амнестический синдром:

- Алкоголизм
- + Шизофрения
- Черепно-мозговые травмы
- Опухоли мозга
- Эпилепсия

?

Заболевания, при которых нарушение памяти является обратимым:

- Черепно-мозговые травмы
- Опухоли мозга
- + Психогении
- Эпилепсия
- Алкоголизм

?

При какой форме шизофрении негативные симптомы являются ведущими:

- Параноидной
- + Простой
- Гебефренической
- Кататонической
- Вялотекущей

?

Выделите **нехарактерные** для аутизма признаки:

- Утрата контактов с окружающими
- Уход во внутренний мир
- Отгороженность
- + Раздражительность
- Замкнутость

?

Назовите синдромы, наиболее часто встречающиеся при шизофрении:

- Астенический
- Депрессивный
- + Галлюцинаторно-параноидный

- Корсаковский синдром
- Маниакальный
- ?

Назовите клинические формы благоприятно-текущей шизофрении:

- Кататоническая
- Гебефреническая
- + Онейроидно-кататоническая
- Простая
- Параноидная
- ?

К активной психопатологической симптоматике относится все, исключая

- галлюцинации
- бред
- расстройства сознания
- иллюзии
- + деменцию