

1. Методы лечения рака молочной железы.

Виды операций при раке груди. Лампэктомия — хирургическое удаление ракового образования (частичное удаление молочной железы);

Квадрантэктомия — удаление квадранта молочной железы, в котором расположено раковое образование; **Мастэктомия. Рак молочной железы**

чувствителен ко многим препаратам: герцептин, авастин, метотрексат, адрибластин, 5-фторурацил, циклофосфан, доцетаксел, паклитаксел, кселода и ряд других. Схемы лечения рака молочной железы: **СМФ** (Циклофосфан, Метотрексат, Фторурацил), **ФАС** (Фторурацил, Адрибластин, Циклофосфан), **САФ** (Циклофосфан, Адрибластин, Фторурацил), а также схемы с таксанами (Доцетаксел, Паклитаксел). **Гормонотерапи. Тамоксифен** – препарат из группы антиэстрогенов. **Ингибиторы ароматазы** назначаются только женщинам в менопаузы. Часто применяются анастрозол (аримидекс), летрозол (фемара) и экземестан (аромазин). *Золадекс* – препарат, который подавляет выделения гипофизом ЛГ. *Лучевая терапия* может снизить риск развития рака молочной железы на 50–66%.

2. Дифференциальная диагностика рака легкого

- 1) **Хроническая пневмония**, 2) абсцесс 3) туберкулез (клиника, диаг-ка –рентген, биопсия на цитологию,манту, анамнез, кт).

3. **Ситуационная задача:** У мужчины 55 лет 3 месяца назад появилась дисфагия. При рентгенологическом исследовании обнаружено сужение просвета пищевода в средней трети грудного отдела на протяжении 3,5 см. При эзофагоскопии пищевод циркулярно сужен до 0,5 см. Гистологически — плоскоклеточный рак. Метастазов нет. Какой метод лечения показан больному?

Ответ: **экстирпация пищевода**