

1-я сортировочная группа – агонизирующие пострадавшие, бесперспективные с несовместимыми с жизнью травмами, а также находящиеся в терминальных состояниях, которым никакая самая современная медицинская помощь не поможет спасти жизнь. Прогноз неблагоприятный.

Пораженные этой группы нуждаются в симптоматическом лечении, облегчение страданий, эвакуации не подлежат. Это ожоги II-III степени до 50%, открытые ЧМТ с размождением вещества головного мозга, травматический шок терминальная фаза, массивные артериальные кровотечения и т.д. маркируется черным цветом.

II сортировочная группа:

Тяжёлые повреждения и отравления, представляющие угрозу для жизни, т.е. пострадавшие с быстро нарастающими опасными для жизни расстройствами основных жизненно важных функций организма, для устранения которых необходимы срочные лечебно–профилактические мероприятия.

Временно нетранспортабельные.

Больные этой группы нуждаются в помощи по неотложным жизненным показаниям.

Эвакуация в 1 очередь, после оказания необходимой ЭМП. Транспорт медицинский. Положение лёжа.

III сортировочная группа - пострадавшие с тяжелыми и средней тяжести повреждениями, не представляющими непосредственной угрозы для жизни.

Медицинская помощь им оказывается во вторую очередь или может быть отсрочена до поступления на следующий этап медицинской эвакуации. , а так же пострадавшие в удовлетворительном состоянии,

которым показана медицинская помощь во 2 очередь. Эвакуация во вторую очередь. Транспорт медицинский.

IV сортировочная группа - пострадавшие с повреждениями средней тяжести с не резко выраженными функциональными расстройствами или без таковых. Направляются на следующий этап эвакуации без оказания медицинской помощи. Эвакуируются самостоятельно или транспортом общего назначения.

Задача № 1

При взрыве получил ранение правого глаза. Жалуется на боли в правом глазу, светобоязнь, снижение зрения, у внутреннего угла правой глазной щели небольшое количество вязкого прозрачного отделяемого. Имеется гематома правого века, зрачок неправильной формы. Жалобы на головную боль, головокружение, сознание не терял. Частично дезориентирован в пространстве, движения замедленные, из правого уха истечение крови, АД = 120/60, ЧСС = 80 уд в мин.

Провести медицинскую сортировку по трем признакам: очередность в оказании медицинской помощи, эвакуационный признак, опасность для окружающих.

Для окружающих не опасен

III сортировочная группа

Нуждается в оказании мед помощи во вторую очередь (на следующем этапе)

Нуждается в Эвакуации во вторую очередь, сидя автотранспорт

Задача № 2

Правая стопа оторвана. Умеренное кровотечение из раны. Кожные края раны разможены, загрязнены землей.

Бледность кожных покровов, холодный пот, АД = 80/40, ЧСС = 110 уд в мин

Провести медицинскую сортировку по трем признакам: очередность в оказании медицинской помощи, эвакуационный признак, опасность для окружающих.

Для окружающих не опасен

2 сортировочная группа

Нуждается в оказании мед помощи в 1 очередь

нуждается в Эвакуации в первую очередь после стабилизации состояния, лежа, авиатранспорт

Задача № 3

Получил удар по левой стопе тяжелым предметом. Первый палец левой стопы утолщен, резкая боль, большой кровоподтек.

Провести медицинскую сортировку по трем признакам: очередность в оказании медицинской помощи, эвакуационный признак, опасность для окружающих.

.

Для окружающих не опасен

4 сортировочная группа

Нуждается в оказании мед помощи на следующем этапе

нуждается в Эвакуации в последнюю очередь, автотранспорт сидя

Задача № 4

Получил ожог лица, кистей, голени, бедер. Беспокоят боли в местах ожогов, на лице и кистях кожа красная, имеются лопнувшие пузыри. На нижних конечностях местами кожа бледная, чувствительность потеряна. Резкая одышка до 40 раз в мин, осиплость голоса, откашливает черную мокроту. АД = 120/80, ЧСС = 90 уд в мин.

Провести медицинскую сортировку по трем признакам: очередность в оказании медицинской помощи, эвакуационный признак, опасность для окружающих.

1. Не опасен для окружающих
2. II сортировочная группа- помощь оказать в первую очередь
3. Эвакуация в первую очередь , лежа, автотранспортом.

Задача № 5

Во время взрыва получил ушиб груди. Дыхание затруднено, частое, поверхностное, отрывистое. Жалуются на боли в области грудной клетки справа, усиливающиеся при дыхании. Положение полусидячее, передняя поверхность грудной клетки деформирована справа, дыхание асимметрично, бледность кожных покровов, при аускультации – дыхание справа резко ослаблено, при перкуссии – тупой звук в нижних отделах. АД= 90/40, ЧСС = 82 уд в мин. Справа определяется подкожная эмфизема.

Провести медицинскую сортировку по трем признакам: очередность в оказании медицинской помощи, эвакуационный признак, опасность для окружающих.

для окружающих не опасен

2 сортировочная группа

Нуждается в оказании мед помощи в первую очередь на данном этапе

нуждается в Эвакуации в первую очередь , лежа , авто

Задача № 6

Во время падения ударился животом о камень. Почувствовал резкую боль в животе, встать не может, бледен, просит пить. Сознание не терял.

Положительный симптом «ваньки-встаньки», АД=120/80, ЧСС=110 уд в мин.

Провести медицинскую сортировку по трем признакам: очередность в оказании медицинской помощи, эвакуационный признак, опасность для окружающих.

Для окружающих не опасен

2 сортировочная группа

Нуждается в оказании мед помощи в первую очередь (на следующем этапе)

Эвакуация в первую очередь , авиатранспортом, лежа

Задача № 7

Во время взрыва был отброшен. Почувствовал сильную боль в области таза. Встать не смог. Нога справа ротирована наружу, симптом «прилипшей пятки», малейшее движение вызывает резкую боль в области таза. Живот в нижних отделах напряжен. АД = 80/60, ЧСС = 100 уд в мин

Провести медицинскую сортировку по трем признакам: очередность в оказании медицинской помощи, эвакуационный признак, опасность для окружающих.

Для окружающих не опасен

2 сортировочная группа

Помощь оказывается в 1 очередь на данном этапе

нуждается в эвакуации в 1 очередь

Задача № 8

При падении почувствовал боль в левом голеностопном суставе. Опереться на конечность не может. Голеностопный сустав деформирован, в области наружной лодыжки большая гематома.

Провести медицинскую сортировку по трем признакам: очередность в оказании медицинской помощи, эвакуационный признак, опасность для окружающих.

для окружающих не опасен

III-IV сортировочная группа

Помощь оказывается на следующем этапе

нуждается в эвакуации во вторую очередь, сидя,

Задача № 9

Во время взрыва упал на правую нижнюю конечность, почувствовал сильную боль в правом бедре, встать не может. Бедро в средней трети деформировано, подвижно. На правом бедре рана 5x10 см. Наложена жгут. В ране видны костные отломки. Бледность кожных покровов, АД = 90/50, ЧСС = 120 уд в мин.

Провести медицинскую сортировку по трем признакам: очередность в оказании медицинской помощи, эвакуационный признак, опасность для окружающих.

Для окружающих не опасен,

вторая сортировочная группа

нуждается в оказании мед помощи в 1 очередь на данном этапе

нуждается в эвакуации в 1 очередь, лежа

Задача № 10

Сознание заторможено. Жалуетесь на сильную головную боль, держитесь руками за голову, временами вскрикиваете от боли. Лицо бледное. Тошнота и повторная рвота. В затылочной области кровоизлияние.

Правый зрачок больше левого, АД = 140/80, ЧСС = 64 уд в мин.

Провести медицинскую сортировку по трем признакам: очередность в оказании медицинской помощи, эвакуационный признак, опасность для окружающих.

для окружающих не опасен

II сортировочная группа

нуждается в оказании мед помощи в 1 очередь на следующем этапе (требуется высокоспециализированная помощь)

нуждается в эвакуации в 1 очередь

Задача № 11

Сознание не расстроено. Получил удар обвалившейся бетонной плитой в позвоночник. Жалуется на боль в спине, не может шевелить ногами и не чувствует нижнюю половину тела. Лицо бледное, дыхание частое. В области грудного отдела позвоночника кровоподтек. Имеются нарушения функций тазовых органов. АД = 110/60, ЧСС = 120 уд в мин.

Провести медицинскую сортировку по трем признакам: очередность в оказании медицинской помощи, эвакуационный признак, опасность для окружающих.

Не опасен для окружающих ,

II сортировочная группа,

нуждается в оказании мед помощи в 1 очередь на данном этапе

нуждается в эвакуации в 1 очередь, лежа + иммобилизация

Задача № 12

С трудом выбрался из загоревшегося помещения. При этом получил ожоги ног, жалобы на боли и жжение в области обожженных поверхностей. На голени и бедрах кожа красное, пузыри, на некоторых небольших участках – бледная.

Провести медицинскую сортировку по трем признакам: очередность в оказании медицинской помощи, эвакуационный признак, опасность для окружающих.

Не опасен для окружающих ,III сортировочная группа,

эвакуация и оказание мед помощи в 2–ю очередь, лежа

Задача № 13

Получил удар металлическим предметом по правой ключице. Активные движения в правой верхней конечности ограничены. Локальная болезненность в области правой ключицы, здесь же определяются подвижные костные отломки.

Определяется деформация ключицы, подвижность костных отломков, подкожная гематома от надключичной области до соска.

Провести медицинскую сортировку по трем признакам: очередность в оказании медицинской помощи, эвакуационный признак, опасность для окружающих.

для окружающих не опасен

4 группа

помощь на следующем этапе

эвакуация во третью очередь, сидя

Задача № 14

Во время взрыва был отброшен ударной волной. Жалобы на сильную боль в левом коленном суставе, где определяется припухлость, деформация. Активные движения отсутствуют. Ходить не может.

Провести медицинскую сортировку по трем признакам: очередность в оказании медицинской помощи, эвакуационный признак, опасность для окружающих.

для окружающих не опасен

4 группа

помощь на следующем этапе

эвакуация во третью очередь, сидя

Задача № 15

Извлечен из-под завала через 1 час. Стонет, безучастен. Средней трети правого бедра ткани размозжены, умеренно кровоточат. В нижней трети левой голени ткани также размозжены, кровоточат. Левая стопа держится на кожном лоскуте. В ране видны костные отломки. Резкая бледность кожных покровов правого бедра, АД = 60/30, ЧСС = 120 уд в мин.

Провести медицинскую сортировку по трем признакам: очередность в оказании медицинской помощи, эвакуационный признак, опасность для окружающих.

для окружающих не опасен

2 сортировочная группа

нуждается в оказании в неотложной помощи на данном этапе в первую очередь

эвакуация в первую очередь, лежа

Задача № 16

Заторможен, сидит опустив голову, выражение лица скорбное, глубоко вздыхает. На вопросы не отвечает. Ни на что не жалуется, видимых травматических повреждений не имеет.

Провести медицинскую сортировку по трем признакам: очередность в оказании медицинской помощи, эвакуационный признак, опасность для окружающих.

1. опасен для окружающих?????????, нуждается в изоляции, в санитарной обработке не нуждается

2. 4 сортировочная группа, нуждается в психологической группе
3. Эвакуация в 3 очередь

Задача № 17

Поведение неправильное. Возбужден, выражение недоумения на лице сменяется страхом. Никого не узнает, куда-то стремится бежать, сопротивляется при попытках удержать и оказать помощь. На вопросы не отвечает. Видимых травматических повреждений не имеет.

Провести медицинскую сортировку по трем признакам: очередность в оказании медицинской помощи, эвакуационный признак, опасность для окружающих.

Опасен для окружающих, подлежит временной изоляции
4 сортировочная группа, оказание медицинской помощи на следующем этапе.

Подлежит эвакуации во вторую очередь, транспортируется изолированно.

Задача № 18

В результате возгорания верхней одежды получил обширные ожоги лица, рук, грудной клетки. Состояние тяжелое, на вопросы отвечает с трудом, дыхание учащено.

Осиплость голоса, кашель с мокротой, одышка, жажда, АД = 90/60, ЧСС = 120 в мин.

Провести медицинскую сортировку по трем признакам: очередность в оказании медицинской помощи, эвакуационный признак, опасность для окружающих.

для окружающих не опасен

2 группа

нуждается в оказании неотложной помощи на данном этапе

нуждается в эвакуации в первую очередь после стабилизации состояния

Задача № 19

Во время взрыва получил травму левого предплечья и ожог лица. Общее состояние удовлетворительное. Самостоятельно передвигается, правой рукой поддерживает левую. Патологическая подвижность средней трети левого предплечья. Лицо красное, отечно.

Провести медицинскую сортировку по трем признакам: очередность в оказании медицинской помощи, эвакуационный признак, опасность для окружающих.

3 сортировочная группа

- Очередность оказания медицинской помощи – пораженные и больные, помощь которым может быть оказана на следующем этапе медицинской эвакуации (может быть отсрочено оказание медицинской помощи);
- Эвакуационный признак – подлежащие эвакуации в другие медицинские организации, во вторую очередь (легкопораженные), стоя, автотранспортом;
- Опасность для окружающих – не нуждающиеся в специальной (санитарной) обработке. не опасен

Задача № 20

В течение 30 минут находился в заблокированном, задымленном помещении. В сознании. Жалуется на сильную головную боль, головокружение, стук в висках, тошноту, рвоту. На лице у пострадавшего красные пятна, пульс резко учащенный, одышка до 40 раз в мин, АД = 140/90.

Провести медицинскую сортировку по трем признакам: очередность в оказании медицинской помощи, эвакуационный признак, опасность для окружающих.

2 сортировочная

- Очередность оказания медицинской помощи – нуждающиеся в медицинской помощи в неотложном порядке на данном этапе;
- Эвакуационный признак – подлежащие оставлению в данной медицинской организации временно или до выздоровления;
- Опасность для окружающих – не нуждается в специальной (санитарной) обработке).

КОРЕШОК ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ КАРТОЧКИ

в ____ час ____ мин ____ 19 ____ г.
 в/звании _____ в/части _____

Фамилия _____ имя _____ отчество _____
 Удостоверение личности, жетон № _____
 Ранен, заболел ____ час ____ мин ____ 19 ____ г.

Эвакуирован самолетом, сан-грузавтом (подчеркнуть)

куда эвакуирован

нужные объекты

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Подчеркнуть	Доза (писать)	Вид санитарных потерь (объекты)
Введено: антибиотик		0
сыворотка ПСС, ПГС		Я
анатоксин (какой)		Х
антидот (какой)		Бак
обезболивающее средство		Другие пораж.
Произведено: переливание крови, кровезаменителей, иммобилизация, перевязка, наложен жгут, свиборботка		Опм
		Б
		И

Диагноз _____

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ

Первичная медицинская карточка Форма 100
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Выдана: _____
кандидатом мед. науки (судимости), или ин. штата)

в ____ час ____ мин ____ 19 ____ г.
 в/звании _____ в/части _____

Фамилия _____ имя _____ отчество _____
 Удостоверение личности, жетон № _____
 Ранен, заболел ____ час ____ мин ____ 19 ____ г.

Подчеркнуть	Доза (писать)
Введено: антибиотик	
сыворотка ПСС, ПГС	
анатоксин (какой)	
антидот (какой)	
обезболивающее средство	
Произведено: переливание крови, кровезаменителей, иммобилизация, перевязка,	

Жгут наложен ____ час ____ мин
 Санитарная обработка (подчеркнуть):
 полная, частичная, не проводилась
 Эвакуировать (нужные объекты).

куда эвакуировать

жгут свкл

Очередность эвакуации: I, II, III.

врач: _____ (подпись, разбавочка)

ИЗОЛЯЦИЯ

0

Я

Х


Бак

Другие пораж.

Опм

Б

И



Диагноз: _____

РАДИАЦИОННОЕ ПОРАЖЕНИЕ

САНИТАРИЯ ОБРАБОТКА