



Эталоны ответов (проба Зимницкого)

№1

1. Суточный диурез снижен (олигурия),
2. Никтурия (в норме НД=1/3СД),
3. Плотность мочи 1028-1040 (гиперстенурия),
4. Такой анализ может встречаться при нефротическим синдроме, острым гломерулонефрите

№2

1. Суточный диурез в норме,
2. Никтурия (в норме НД=1/3СД),
3. Плотность мочи 1028-1040 (гиперстенурия),
4. Такой анализ может встречаться при декомпенсации сахарного диабета, нефротическим синдроме, острым гломерулонефрите.

№3

1. Суточный диурез резко повышен,
2. Никтурия (в норме НД=1/3СД),
3. Плотность мочи 1000-1002 (гипостенурия, изостенурия),
4. Такой анализ может встречаться при декомпенсации несахарного диабета (несахарного мочеизнурения).

№4

1. Суточный диурез в норме,
2. Никтурия (в норме НД=1/3СД),
3. Плотность мочи 1000-1002 (гипостенурия, изостенурия),
4. Такой анализ может встречаться при хроническом пиелонефрите, хронической почечной недостаточности 1 ст.

№5

1. Суточный диурез снижен (олигурия),
2. Никтурия (в норме НД=1/3СД),
3. Плотность мочи 1040-1043 (гиперстенурия),
4. Такой анализ может встречаться при острым гломерулонефрите..

№6

1. Суточный диурез в норме
2. Никтурия (в норме НД=1/3СД),
3. Плотность мочи 1004-1014 (гипостенурия),
4. Такой анализ может встречаться при хроническом пиелонефрите, хроническом гломерулонефрите, хронической почечной недостаточности 1 ст.



№7

1. Суточный диурез в норме
2. В норме $НД=1/3СД$,
3. Плотность мочи 1018-1024 (норма),
4. Такой анализ может встречаться в норме.

№8

1. Суточный диурез в норме
2. В норме $НД=1/3СД$,
3. Плотность мочи 1018-1024 (норма),
4. Такой анализ может встречаться в норме

№9

1. Суточный диурез в повышен (полиурия)
2. Никтурия (в норме $НД=1/3СД$),
3. Плотность мочи 1011-1013 (гипостенурия, изостенурия),
4. Такой анализ может встречаться при хроническом гломерулонефрите, приеме диуретиков, хронической почечной недостаточности 1 ст..

№10

1. Суточный диурез в норме
2. $НД=1/3СД$ (в норме $НД=1/3СД$),
3. Плотность мочи 1011-1013 (гипостенурия, изостенурия),
4. Такой анализ может встречаться при хроническом пиелолонефрите, хронической почечной недостаточности 1 ст..

№11

1. Суточный диурез несколько снижен
2. $НД=1/3СД$ (в норме $НД=1/3СД$),
3. Плотность мочи 1021-1025 (норма),
4. Такой анализ может встречаться при сухоядении.

№12

1. Суточный диурез значительно снижен (олигурия)
2. Никтурия (в норме $НД=1/3СД$),
3. Плотность мочи 1000-1002 (гипостенурия, изостенурия),
4. Такой анализ может встречаться при хронической почечной недостаточности терминальная стадия.



Эталоны ответов к оценке уровня билирубина

№1

1. выраженная гипербилируминемия за счет непрямой фракции (холестатический синдром).
2. такой анализ может встретиться при внутрисосудистом гемолизе, гемолитических анемиях.

№2 норма

№3

1. выраженная гипербилируминемия за счет прямой фракции (холестатический синдром).
2. такой анализ может встретиться при поражении паренхимы печени, хроническом активном гепатите.

№4

1. умеренная гипербилируминемия за счет прямой фракции (холестатический синдром).
2. такой анализ может встретиться при поражении паренхимы печени, хроническом гепатите.